questions

Reponse a Messieurs de L'Academie Royale de Paris sur les questions faite a Micallef ancien ayde major des hopitaux du Roy et Me. chirurgien a Cosne sur loire au sujet dune Exfoliation et chute de presque toutte la partie et totalité de los Tibia dun Enfant de lage de 9 ans.

1°. avez vous fait des Seignée dans le commencement de L'Inflammation

N'ayant pas eté appellé a tems pour pouvoir faire les Seignées qui auroient deu être faite des le commencement; La chute des humeurs et L'Inflammation étoient si abondante dans toutte la jambe que je commencé par faire des Scarifications appréhendant la mortification et gangrenne, La partie en fut fort Soulagée L'inflammation diminua tres considerablement je seigné le malade le landemain; L'inflammation à La faveur de ces deux moyens cessa presque entierement Je senti au tac avec bien de la facillité qu'il y avoit une abondance d'humeurs qui se disposoient a une maturité Supurable et pour l'accellerer j'y appliqué pendant 2 a 3 jours des cataplasme anodins et Emoliens lesquels jarosois de quelques goutte d'eau de vie pour facilliter une douce transpiration et maturité.

2°. Le foyer de labsceds étoit il profond.

Le Volume de la tumeur etant fort étandu joint a la connoissence certaine que jen tiray par le tac me donnerent a connoître que le fond de labsceds devoit être profond.

3°. quentendez vous par les parties anterieures de la jambe tout le Long du Tibia et Peroné.

Jentent par les parties anterieures de la jambe tout le long du tibia et Peroné, Comprendre les parties superieures, moyenne, et Inferieures qui composent le devant de la jambe.

4°. Pourquoy avez vous fait trois Incisions et quelles étoient vos vües.

Ayant trouvé Le Volume de la Tumeur fort étandu et pensant par le jugement du Tac que le foyer de labsceds devoit être profond et quil pouroit par la suitte se cantonner des humeurs dans les parties lateralles de la jambe comme dans les Intercistens des muscles pour Eviter a ses accidents je jugé apropos de faire trois ouvertures Sçavoir la prem.re a la partie la plus basse de la tumeur, et les deux autres dans le même instant a coté opposé chacune de L'os Tibia elloigné de sa crête denviron un pouce desquelles trois ouvertures je tiray quantité de pus Louable et fort épois et plusieurs pellicules membraneuses qui avoient beaucoup de Consistence, qui ne pouvoient être que les membrannes commune des muscles qui avoient étés alterées et separée des corps musculeux.

5°. Sur quel fondement Esperez vous que les extremitez Superieures et Inferieures du Tibia joint au Peroné qui na point Souffert dalteration Suffiront pour Soutenir le poids du Corps

Je Repond a La cinquieme que le fondement sur lequel jespere que Les extremitez tant Superieures quinferieures du Tibia joint au peroné qui na point souffert pour soutenir le poids du corps, C'est que les Sucs nourissiers dun Jeune enfant se trouvent fort abondant et dans un bon sujet comme le Mien ses mêmes Sucs hors de la direction de leurs routte se trouvent ~~plus~~ tout disposés a une coagullation osseuse étant de nature de Cal formeront par leurs chutes

ARC 39 n° 165

Académie nationale de médecine — Bibliothèque

Et Sejourd vn corps osseux qui quoy que mal disposé par son arrangement e
jrregullier recevra nouriture et poura former quelques attache de Liaison avec e
le Peroné qui Suffiront pour Soutenir le poids du corps a joindre que le peroné
recevra plus de force

6°
Que faut jl quil arrive aux deux éxtrémitez du Tibia pour que le malade puisse se Soutenir Sur cette Jambe

La sixjeme Se trouve presque resolüe par la
reponse de la cinquieme en ce quelle ont beaucoup de Rapport et
de Liaison Cependant je pense qua chacune extrémité de los
Tibia il se formera un corps osseux par les Sucs Nourissiers
qui Si porteront et qui Se convertiront en nature de Cal qui
Se durcira et vivra dune vie commune, comme jl nous est
donné pour lexemple quand vne branche darbre quoy que rompüe
a moytié; aux deux tiers, ou plus, recevant les Sucs Nouriciers
Vegetatifs quoy qu hors de leurs routte formes des gourmes
ou nodositez qui Subsistent autant que les autres parties e
quoy quelles Soient exposée au fardeau du poids des fruits quelles
raportent.

7°
Si le malade est guery et combien de temps en tout a duré Sa Cure Si la jambe est difforme,

La derniere Reponse que jay lhonneur de faire
est remplie de Sureté en ce que le jeune enfent agé de 4 ans
est en parfaite Santé quil Se Soutient des deux jambes Egalement
et marche Librement, La Cure à duré en tout Six mois,
La jambe n'est point difforme, Lestampe que jenvoye la
designe; La grande piece dos na pas beaucoup formé de
Playe ny cicatrice ainsy quon le voira en constatant los
que jenvoye layant tiré comme on tire vn couteau de sa gueine
a Legard des Exfoliations de la partie Superieure du même
os tibia elles Se sont faite en different temps et en plusieurs
Pieces qui ont etée jettez et qui ne peuvent être rapportez

Jay Lhonneur d'être Messieurs avec tutres profond
respect

a Cosne sur Loire
ce 27e 7bre 1742

Votre tres humble tres obeïssant Serviteur
Miealle f

n° 60.



A. fait le commencement de la
cicatrice

c.. marque le commencement de la
grande exphotiation

6.. termine la fin de la cicatrice qui
est de profondeur de l'epeisseur
d'un Ecu dans toutte sa longueur

d marque la fin de l'exphotiation de
la grande piece de l'os

Depuir Le 6. jusqu'au d. Il n'y a
point eu de plaie quoy que la
grande Exphotiation en soit sortie
et consequemment point de cicatrice
Extrieured.

ARC 39 n° 165

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE